

## Обследоваться на гепатит можно здесь:

- в своей поликлинике по направлению врача-инфекциониста или другого врача **бесплатно**;
- в Городской инфекционной клинической больнице ул. Кропоткина 76, тел. 334-17-21, 334-34-68 (**платно**);
- в 10-й клинической больнице, тел. 345-32-71 (**платно по паспорту**);
- в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ/СПИД ГУ РЦГЭиОЗ по ул. К. Цеткин, 4, 3-й этаж. тел. 321-22-68 (**анонимно платно**).

БОО «Позитивное движение»  
помощь людям, затронутым проблемами  
наркомании и ВИЧ-инфекции  
г. Минск, ул. Матусевича, 23-204  
тел.: +375 (17) 286 16 53


[www.pmplus.by](http://www.pmplus.by)



Вклад в наше будущее  
**Глобальный фонд**  
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией



**СДАЙТЕ АНАЛИЗ  
на ГЕПАТИТ –  
БУДЬТЕ В КУРСЕ!**



*Гепатит (В и С) – часто встречающаяся инфекция, приводящая к повреждению печени. Часто люди уже являются носителями болезни, но еще не чувствуют себя больными (нет симптомов). В этом случае человек может заразить других людей.*

#### **Гепатитом можно заразиться:**

- даже при единичном половом контакте с партнером, у которого есть гепатит;
- при использовании предметов, на которых могут оставаться мельчайшие частицы крови (маникюрный инструмент, бритва);
- на всех этапах изготовления, снятия пробы и введения наркотика, так как на инструментах могут оставаться мельчайшие частицы крови (шприц, посуда, салфетки);
- при использовании чужого инструментария для вдыхания порошковых наркотиков (соломинки, трубочки, свернутые банкноты и т.п.).

**Обратитесь к врачу для того чтобы узнать, есть у Вас гепатит или нет, если:**

- у Вас были сексуальные контакты с разными партнерами без презерватива;
- Вы используете совместные предметы для употребления наркотиков: шприц, фильтры, ложки, посуду.

**Надо обратиться к врачу за лечением, если заметили у себя следующие симптомы:**

- потеря аппетита;      • боли в животе;
- недомогание;
- тошнота и рвота, жидкий стул, запор, обесцвеченный кал;
- непереносимость алкоголя и жирной пищи.

#### **Что надо делать:**

- сдать анализ на наличие гепатита;
- использовать презерватив при сексуальных контактах;
- использовать стерильные шприцы, а также фильтры, ложки, перетяжки; если нет возможности – использовать только свои предметы;
- избегать любого контакта с чужой кровью, даже если она не свежая.